

ATCOM HEPAR-B

Artikelnummer 5844



Produktbeschreibung

ATCOM Hepar-B

Het zaad van mariadistel (*Silybum marianum*) bevat silymarine en silibinine. Silymarin & silibinine hebben hepatoprotectieve, antioxidant en ontstekingsremmende activiteiten (Vargas-Mendoza et al., 2014; Bahmani et al., 2015; Dehmlow et al., 1996). Dit zorgt voor een optimale ondersteuning van de leverstofwisseling. Artisjok (*Cynara scolymus*) bevat een breed spectrum aan leverondersteunende stoffen (waaronder cynarine) en wordt van oudsher toegediend ter ondersteuning van de lever en het spijsverteringsstelsel (Aksu & Altinterim, 2013; Colak et al., 2016). De interactie van deze fytonutriënten in combinatie met andere geselecteerde kruiden ondersteunt zo op natuurlijke wijze de leverstofwisseling.

Omdat de lever en het spijsverteringskanaal zeer nauw met elkaar verbonden zijn, bevat Hepar-B gerichte doses hooggedoseerde B-vitaminen, omdat darm- en leverstress kunnen leiden tot een vermindering van de intrinsieke synthese.

Hepar-B heeft een hoog gehalte aan organisch gebonden zink, omdat zink een sleutelrol speelt in talrijke enzymfuncties in de stofwisseling en daarom essentieel is voor de leverstofwisseling.

Lecithine, carnitine en cholinechloride ondersteunen de vetstofwisseling in de lever en helpen zo de leverstofwisseling te ontlasten via orale inname.

Druivenpitten en rozenbottels in combinatie met zink, organisch gebonden selenium en vitamine E kunnen het hele immuunsysteem ondersteunen.

***Bronnen**

Vargas-Mendoza N, Madrigal-Santillán E, Morales-González A, et al. Hepatoprotectieve werking van silymarine. World J Hepatol. 2014;6(3):144-149. doi:10.4254/wjh.v6.i3.144

Bahmani M., Shirzad H., Rafieian S., Rafieian-Kopaei M. (2015). Silybum marianum: verder dan hepatoprotectie. J. Evid. Based. Complement. Altern. Med. 20, 292-301. 10.1177/2156587215571116

Demlow C., Erhard J., de Groot H. (1996). Inhibition of Kupffer cell function as an explanation for the hepatoprotective properties of silibinin. Hepatology. Vol 23, Issue 4.

Aksu Ö. & Altinterim B. (2013). Hepatoprotectieve effecten van artisjok (Cynara scolymus). ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Colak, E., Ustuner, M.C., Tekin, N. et al. The hepatocurative effects of Cynara scolymus L. leaf extract on carbon tetrachloride-induced carbon tetrachloride-induced oxidative stress and hepatic injury in rats. SpringerPlus 5, 216 (2016). <https://doi.org/10.1186/s40064-016-1894-1>

Neem de nationale en internationale dopingreglementen in acht. Volgens de FN (ADMR vanaf januari 2019) heeft dit product een aflossingsvrije periode van 2 dagen.

Kurzbeschreibung

Voor voedende ondersteuning van de leverstofwisseling met gerichte voedingsstoffen en secundaire plantaardige ingrediënten.

Produktdetails

Samenstelling

Biergist, maïskiemmen, fijn lijnzaadschilfersmeel, voorgegelatineerd tarwemeel, suikerbietenmelasse, alfalfameel, artisjok, yucca, plantaardig vet (koolzaad/kokos), lijnzaadolie, zwarte komijnolie, mariadistelzaad, druivenpitten, rozenbottel, pijnboomschors, sinaasappelolie, anijszaad, knoflook, venkel, karwijolielijnzaadolie, zwarte komijnolie, mariadistelzaad, druivenpitten, rozenbottel, pijnboomschors, sinaasappelolie, anijszaad, knoflook, venkel, karwijvenkel, fenegriekzaad, zoethoutwortel, ijslands mos, ribkruid, pepermint, marshmallowwortel, malvebloesem, zwarte komijn, distelzwarte komijn, tijm, salieblaadjes, primula's, vlierbloesem, lindebloesem, sparrenscheuten, eucalyptusblaadjes

Analytische ingrediënten

Ruw eiwit	20,6 %	Natrium	0,1 %
Ruw vet	4,4 %	magnesium	0,1 %
Ruwe celstof	2,3 %	Kalium	0,6 %
Ruwe as	4,0 %	Methionine	10 %
calcium	0,1 %	lysine	0,5 %
fosfor	0,2 %	threonine	0,3%

Toevoegingen per kg

Vitamine C als L(+)-ascorbinezuur zuivere stof (3a300)	20.000 mg
Vitamine E als alfa-tocoferolacetaat (3a700)	10.000 mg
Vitamine B1 als thiaminemononitrat, zuivere stof (3a821)	5.000 mg
Vitamine B2 als riboflavine zuivere stof	3.000 mg
Vitamine B6 als pyridoxoolhydrochloride zuivere stof (3a831)	8.000 mg
Vitamine B12 als vitamine B12-preparaat	15.000 µg
Nicotinezuur als zuivere nicotinamide (3a314)	10.000 mg
Pantotheenzuur als Ca-D-pantothenaat zuivere stof (3a841)	4.000 mg
Foliumzuur als foliumzuur zuivere stof (3a316)	300 mg
Cholinechloride als cholinechloride-preparaat (3a890)	35.000 mg
Betaïne als pure betaïne	10.000 mg
Zink als glycinezinkchelaat, hydraat (E6)	5.000 mg
Selenium als natriumseleniet (E8)	5 mg
Selenium als selenium in org. Vorm van Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (geïnactiveerde seleniumgist) (3b810)	5 mg
L-carnitine als trimethylamine van amino-4-hydroxy-3-boterzuur	2.500 mg
DL-methionine, technisch zuiver (nr. 3c301)	100.000 mg
Lecithine (E 222)	49.800 mg
Diatomeeënaarde (diatomeeënaarde, gezuiverd) (E551c)	5.000 mg

Fütterungsempfehlung

Voedingsadvies ATCOM HEPAR-B

10 g per 100 kg lichaamsgewicht

Geef grote paarden met een lichaamsgewicht van 600 kg 60 g per dag via het krachtvoer. Indien mogelijk, verdeel de dagelijkse hoeveelheid in 2 doses (2 x 30 g per dag).

Wij adviseren ATCOM Hepar-B toe te dienen over een periode van 4 - 8 weken.

Neem de nationale en internationale dopingregels in acht. Volgens de FN heeft dit product een wachttijd van 2 dagen.

Weitere Bilder

